

Együtt járás vagy helyettesítés? – Különböző rizikómagatartások kapcsolódása, és a velük szembeni védőfaktorok

Hajdu Miklós–Horváth Ágoston


*Budapesti Corvinus Egyetem Kutatási Hét
2024. 02. 06.*

Tartalom

- Fogasztási csoportok azonosítása az egyetemisták körében
- A csoportok jellemző fogasztási mintázatai
- Szociodemográfiai jellemzők
- A mérsékelt csoportba tartozás magyarázata, védőfaktorok


Fogyasztás csoportok azonosítása

- Bemeneti információk
 - Szerfogyasztási szokások (alkohol, dohányzás, drog)
 - Viselkedési függőségek (internetezés, szociális média, online játék, képernyőhasználat, evészavar)
- Hierarchikus klaszteranalízis




Fogyasztási csoportok megoszlása

Elnevezés	Gyakoriság (súlyozatlan esetszám)	Arány (súlyozott) (%)
Átlagos érintettség	354	32,4
<i>Minden szempontból mérsékelt</i>	526	44,0
Gyógyszer- és droghasználat, problémás net- és közösségi média használat, evészavar átlag fölött	171	14,0
<i>Minden szempontból súlyosan érintett</i>	97	9,6
Összesen	1148	100,0




Fogyasztási csoportok jellemzői: drogfogyasztás, dohányzás

	1 - Átlagos érintettség	2 - Minden szempontból mérsékelt	3 - Gyógyszer- és droghasználat, problémás és közösségi média használat, evészavar átlag fölött	4 - Minden szempontból súlyosan érintett	Teljes sokaság
Kannabiszfogyasztás legalább havonta	0,8%	0,0%	0,0%	92,5%	9,1%
Visszaélésszerű gyógyszerhasználat életprevalencia	0,3%	0,0%	98,7%	33,0%	17,2%
Dizájner életprevalencia	5,9%	0,0%	10,3%	23,6%	5,6%
Droghasználati célú szerfogyasztás életprevalencia	2,5%	0,4%	4,5%	14,0%	3,0%
Drogfogyasztás életprevalencia	66,0%	1,4%	100,0%	100,0%	45,6%
Tiltott szerek életprevalencia	62,6%	1,4%	47,7%	100,0%	37,1%
Dohánytermék fogyasztás legalább naponta	25,4%	0,2%	20,0%	54,2%	16,4%




Fogyasztási csoportok jellemzői: alkoholfogyasztás

		1 - Átlagos érintettség	2 - Minden szempontból mérsékelt	3 - Gyógyszer- és droghasználat, problémás net- és közösségi média használat, evészavar átlag fölött	4 - Minden szempontból súlyosan érintett	Teljes sokaság
Egy alkalommal 6 ital fogyasztása az elmúlt évben hányszor fordult elő?	Minden nap, vagy majdnem minden nap	0,3%	0,0%	0,0%	3,8%	0,5%
	3-4-szer egy héten	1,4%	0,4%	1,9%	2,9%	1,2%
	1-2-szer egy héten	8,9%	1,4%	7,1%	26,7%	7,0%
	1-3-szor egy hónapban	27,0%	11,5%	17,3%	27,6%	18,9%
	6-11-szer egy évben	13,1%	13,1%	15,4%	10,5%	13,2%
	1-5-ször egy évben	24,8%	27,7%	27,6%	21,0%	26,1%
	Nem ittam az elmúlt 1 évben, de korábban ittam	13,1%	8,8%	9,0%	4,8%	9,8%
	Soha nem ittam	11,4%	37,1%	21,8%	2,9%	23,4%
RAPS-skála	0	51,3%	68,3%	45,5%	31,1%	56,0%
	1	30,1%	20,0%	26,9%	21,7%	24,4%
	2	13,4%	9,7%	20,5%	30,2%	14,4%
	3	5,3%	2,1%	5,1%	15,1%	4,8%
	4	0,0%	0,0%	1,9%	1,9%	0,5%
Totalszesz átlag (évi összes fogyasztás tisztaszeszenben, dl)		121,4	49,3	113,6	327,3	108,3




Fogyasztási csoportok jellemzői: képernyőhasználat, viselkedési függőségek

		1 - Átlagos érintettség	2 - Minden szempontból mérsékelt	3 - Gyógyszer- és droghasználat, problémás net- és közösségi média használat, evészavar átlag fölött	4 - Minden szempontból súlyosan érintett	Teljes sokaság
Telefonra kapott értesítés	Azonnal megnézem	44,5%	43,0%	46,8%	51,4%	44,8%
	1-2 óránként nézem meg	40,1%	32,1%	34,6%	30,8%	34,9%
	Naponta többször	14,0%	22,2%	16,7%	17,8%	18,4%
	Naponta egyszer nézem meg	1,1%	1,0%	1,3%	0,0%	1,0%
	Nem foglalkozom vele	0,3%	1,6%	0,6%	0,0%	0,9%
Közösségi médiahasználatra fordított idő (napi óra)		2,2	2,3	2,5	2,6	2,3
Online játékokra fordított idő (napi óra)		1,3	0,3	0,5	0,6	0,7
Összes képernyő előtt töltött idő (napi óra)		7,1	6,2	6,8	7,1	6,6
Problémás internethasználat (skála átlag)		18,5	18,4	20,2	20,3	18,8
Problémás internethasználat rizikócsoportba tartozók aránya		26,5%	25,3%	37,4%	36,8%	28,5%
Problémás közösségi média használók aránya		2,5%	5,3%	13,2%	12,3%	6,2%
Evészavar kockázat fennállásának aránya		20,4%	22,4%	34,2%	22,4%	23,4%



Fogyasztási csoportok a felsőoktatási intézmény székhelye szerint



■ Átlagos érintettség


■ Minden szempontból mérsékelt

■ Gyógyszer- és droghasználat, problémás net- és közösségi média használat, evészavar átlag fölött

■ Minden szempontból súlyosan érintett



Fogyasztási csoportok nemek szerint



■ Átlagos érintettség


■ Minden szempontból mérsékelt

■ Gyógyszer- és droghasználat, problémás net- és közösségi média használat, evészavar átlag fölött

■ Minden szempontból súlyosan érintett



Fogyasztási csoportok a hallgatók munkavállalása szerint



□ Átlagos érintettség

■ Minden szempontból mérsékelt


■ Gyógyszer- és droghasználat, problémás net- és közösségi média használat, evészavar átlag fölött

■ Minden szempontból súlyosan érintett




Mérsékelt csoportba tartozás magyarázata, védőfaktorok

- Mérsékelt fogyasztási csoportba tartozás mint védőfaktor
- Bináris logisztikus regresszió
 - Szociodemográfiai/szocioökonómiai státusz
 - Pszichoszociális háttér



Mérsékelt csoportba tartozás magyarázata, védőfaktorok – eredmények

	Esélyhányados	Átlagos marginális hatás	Szignifikancia	Védőfaktor
Nem (lány)	1,723	0,121	0,000	+
<i>Budapesten van az állandó lakhelye</i>	0,692	-0,081	0,032	–
<i>Havi jövedelem (ezer Ft-ban)</i>	0,997	-0,001	0,000	–
<i>Szabadidejében csak úgy elvan otthon vagy máshol</i>	1,188	0,038	0,000	–
Élettel való elégedettség	1,016	0,003	0,002	+
<i>Normátlanság</i>	0,809	-0,047	0,000	–
Nagelkerke R2	0,145			
Esetszám	959			





MTA-BCE Társadalomepidemiológiai Kutatócsoport

Köszönjük a figyelmet!

agoston.horvath@uni-corvinus.hu

miklos.hajdu@uni-corvinus.hu

www.devianciakutatas.hu