


Egyetemisták szerfogyasztása

Elekes Zsuzsanna – Arnold Petra



Az adatfelvétel módszere:

A kutatás célcsoportja:


- 2021/2022-es tanév második, illetve a 2022/2023-as tanév első féléve folyamán aktív státuszú, tanulmányaikat magyar nyelven, *nappali munkarenden, alap- vagy osztatlan* képzésben folytató hallgatók

Az adatfelvétel módja:

- az egyetemisták *országos reprezentatív mintáján, önkitöltős online* kérdőívvel


Témakörök:

- Dohányzás, alkoholfogyasztás, egyéb drogok fogyasztása, viselkedési függőségek: evészavar, internet-, közösségi oldal használati zavar, szocio-demográfiai jellemzők, szabadidőeltöltési szokások, képernyőhasználat, mentális egészség, egészségmagatartás, negatív életesemények, társas támogatás



A minta jellemzői:

- A tisztítás utáni minta nagysága: *1385 fő*
- 52,3% lány; 47,7% fiú
- Vidéki intézményben tanul: 50,3%; fővárosban 49,7%
- Társadalomtudományi képzés: 58%, reál
természettudományos képzés: 28,2%, élettudományi képzés:
13,8%




Szerfogyasztási szokások:


Dohányzás

- 43,6% fogyasztott bármilyen dohányterméket az előző évben
- 17,9% használ valamit napi rendszerességgel
- Dominálnak a hagyományos dohánytermékek

*A napi rendszerességgel valamilyen dohányterméket
használók aránya a teljes minta százalékában*




- A dohányzás *kevésbé gyakori az egyetemisták között*, mint a hasonló korú átlag népesség körében.
- 2019. évi ESPAD kutatás 9-10. évfolyamos hallgatóihoz képest az egyetemisták körében a bármilyen dohányterméket napi rendszerességgel használók aránya csekély mértékben magasabb volt,
- fiúknál elterjedtebb a dohányzás,
- a *vidéki székhelyű felsőoktatási intézményekben kis mértékben elterjedtebb* a dohányzás.



Alkoholfogyasztás


- 94% fogyasztott alkoholt a megelőző évben,
- *egyharmad részük heti rendszerességgel,*
- a heti rendszerességű fogyasztás a fiúknál kétszer olyan elterjedt, mint a lányoknál.

Legalább heti rendszerességgel italt fogyasztók aránya italfajtánként és nemként (%)




- A fiatal felnőttekre vonatkozó prevalencia értékek alapján az *egyetemisták körében jóval elterjedtebb az alkoholfogyasztás.*
- A gyakorisági adatok alapján az egyetemisták *nem különböznek jelentősen a középiskolásoktól.*
- Az egy tipikus alkalommal elfogyasztott alkohol tisztaszeszre átszámított *mennyisége több, mint kétszerese a középiskolásoknál mért értékeknek.*

Egy átlagos alkalommal elfogyasztott alkohol mennyisége az adott típusú alkoholt fogyasztóra számolva és összesen (tisztá szeszben cl/fogyasztó)




- Kétharmad számolt be előző évi nagyivásról,
- 27% havi rendszerességgel iszik egyszerre nagy mennyiséget
- Hasonló arány, mint a fiatal felnőtteknél
- Kisebb, mint a középiskolásoknál
- *41% számolt be valamilyen problémás fogyasztásra utaló tünetről* – korábbi országos felnőtt mintán 10,3%

A nagyivás gyakorisága ez előző 12 hónapban nemenként (%)




- *Fiúkra jellemzőbb az alkoholfogyasztás.*
- *Fővárosi intézményekben elterjedtebb és nagyobb mértékű az alkoholfogyasztás.*
- Jelentősebb mértékű a természettudományokat tanulók között, társadalomtudományokat tanulóknál átlag alatti.
- Eltérően a középiskolásoktól és a fiatal felnőttektől nem otthon, hanem *kocsmákban, bárban, pubokban isznak*




Egyéb drogok fogyasztása

- Közel *minden második egyetemista kipróbált már valamilyen egyéb drogot*
- *Markánsabban érintettek, mint a középiskolások és a fiatal felnőttek*


A különböző típusú szerfogyasztás életprevalencia értéke a hazai egyetemisták körében összevetve az ESPAD és az OLAAP kutatás eredményeivel, %



Az egyes szerek életprevalencia értéke a hazai egyetemisták körében, %




- *A kannabisz életprevalencia értéke több mint 3,5-szer nagyobb az egyetemisták körében a 18-34 éves korosztályhoz képest, és több mint kétszer nagyobb a 9-10. évfolyamos korosztályhoz képest.*
- *Az összes szerfogyasztás gyakoriságát vizsgálva azt láthatjuk, hogy a hazai egyetemisták több mint negyede többszöri használó*
- *Fiúk érintettebbek*
- *Budapesten magasabb az összes szerfogyasztás aránya*
- *Párkapcsolat nem mutat szignifikáns kapcsolatot a droghasználattal*
- *Jelenleg dolgozók nagyobb arányban próbálták ki valamilyen drogot, mint akik nem dolgoznak*



Összegezve:

- Középiskolásokra és fiatal felnőttekre vonatkozó eredményekhez képest az egyetemisták között
 - sokkal elterjedtebb a tiltott szerek fogyasztása,
 - gyakoribb az alkoholfogyasztás, a problémás alkoholfogyasztásra utaló tünetek előfordulása,
 - kevésbé elterjedt a dohányzás



Köszönjük a figyelmet!

